

Patient: \_\_\_\_\_

## Inhalationsbehandling med Herkules/Albatross nebulisator

Du har fått låna en nebulisator för att behandla andningssvårigheter hos ditt barn. Vi använder i allmänhet två sorters läkemedel – inflammationshämmande (kortison) och luftrörsvidgande.

### Inflammationshämmande behandling

Pulmicort (kortisonpreparat) verkar inte direkt utan behöver ges som en kur över dagar till veckor tills andningsbesvär och hosta försvunnit.

Läkemedlet skall användas tills det tar slut i behållaren.

Pulmicort \_\_\_\_\_ µg/ml \_\_\_\_\_ inhalationer \_\_\_\_\_ ggr dagligen i \_\_\_\_\_ dagar

Pulmicort \_\_\_\_\_ µg/ml \_\_\_\_\_ inhalationer \_\_\_\_\_ ggr dagligen i \_\_\_\_\_ dagar

### Luftrörsvidgande behandling

Luftrörsvidgande behandling finns i olika varianter. Gemensamt för alla är att de verkar direkt och effekten varar 2-4 timmar. **Behandla vid akuta andningsbesvär såsom pipig, väsande andning, lång utandning eller besvärlig hostattack.**

Läkemedlet skall ges på ½ minut och barnets tillstånd bedömas ca.10 minuter senare. Vid otillräcklig effekt upprepas behandlingen med ½ min ytterligare 1-3 ggr inom ca.30 min. Om barnets tillstånd ej förbättrats efter detta skall ni söka sjukvården för en läkarbedömning.

Vid god effekt av behandlingen enligt ovan kan den upprepas \_\_\_\_\_ggr/dygn

Alternativ 1, blanda:	
Adrenalin 1 mg/ml	
Atrovent 0,25 mg/ml	
Ventoline __ mg/ml	
Natriumklorid	

Alternativ 2, blanda:	
Adrenalin 1 mg/ml	
Atrovent 0,25 mg/ml	
Ventoline__mg/ml	
Natriumklorid	

OBS! Blandade luftrörsvidgande lösningar håller i 12 timmar och kan användas vid flera behandlingar så länge det finns vätska kvar.

Ordinerande läkare: \_\_\_\_\_

Återbesök: \_\_\_\_\_